

GAZDASÁGMATEMATIKA KÖZÉPHALADÓ SZINTEN





SZÉCHENYI TERV

GAZDASÁGMATEMATIKA KÖZÉPHALADÓ SZINTEN

Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041 pályázati projekt keretében
Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén
az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék,
az MTA Közgazdaságtudományi Intézet,
és a Balassi Kiadó
közreműködésével.



Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638



MAGYARORSZÁG MEGÚJUL



A projekt az Európai Unió
támogatásával valósul meg.



ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék

Gazdaságmatematika középfeladó szinten

4. hét
KOMPLEX SZÁMOK

Készítette: Lovics Gábor
Szakmai felelős: Lovics Gábor

- 1 Alapfogalmak
- 2 Geometriai szemléltetés
- 3 Műveletek és polinomok

A másodfokú egyenlet megoldóképletét már az ókorban is ismerték. Természetes volt az igény arra, hogy harmad- és magasabb fokú egyenleteket is meg akartak oldani. A harmadfokú egyenlet általános megoldására a 16. századig várni kellett. (Speciális alakú egyenleteket korábban is megoldottak, de ezeket titokban tartották.) Az egyenlet megoldása azért tartott ilyen sokáig, mert a megoldáshoz bővíteni kellett a valós számok halmazát. A megoldóképletben ugyanis gyököt kell vonni negatív számokból. Mára ismertté vált, hogy ötöd- és annál magasabb fokú egyenleteknek nincs megoldóképlete, ráadásul a harmad- és negyedfokú egyenletet is inkább számítógépekkel oldjuk meg, mint analitikus képletekkel. Az új számok azonban több más területen is hasznosnak bizonyultak.

A valós számkör bővítésénél arra törekszünk, hogy a valós számokon definiált műveletek és az azoknál megszokott műveleti azonosságok a bővített számkörben is igazak legyenek. Az új számokat úgy érdemes tehát definiálni, hogy igazak legyenek a következő átalakítások:

$$\sqrt{-4} = \sqrt{(-1) \cdot 4} = \sqrt{4}\sqrt{-1} = \sqrt{4}\sqrt{-1} = 2\sqrt{-1};$$

$$\sqrt{-3} = \sqrt{(-1) \cdot 3} = \sqrt{3}\sqrt{-1}.$$

Ezen átalakításokat felhasználva könnyen megmutatható, hogy az összes olyan szám, amelyet négyzetre emelve negatív számot kapunk, előáll a következő alakban:

$$a\sqrt{-1}, \quad a \in \mathbb{R}.$$

Mivel ezek a számok nem valósak, ezért azokat képzetes (képzelt) vagy imaginárius számoknak nevezzük.

Az i

Mivel az összes imaginárius szám képezhető mint a $\sqrt{-1}$ többszöröse, ezért érdemes bevezetni az

$$i = \sqrt{-1}$$

jelölést. Kérdés, hogy hogyan végezzünk műveleteket ezekkel a képzetes számokkal.

Legyen $a, b \in \mathbb{R}$, ekkor a képzetes számok összege:

$$ai + bi = a\sqrt{-1} + b\sqrt{-1} = (a + b)\sqrt{-1} = (a + b)i;$$

képzetes számok szorzata:

$$(ai)(bi) = (a\sqrt{-1})(b\sqrt{-1}) = ab\sqrt{-1}\sqrt{-1} = -ab;$$

képzetes szám és valós szám összege:

$$a + bi = a + b\sqrt{-1};$$

képzetes szám és valós szám szorzata:

$$a(bi) = ab\sqrt{-1}.$$

Komplex számok

Milyen számot kapunk, ha összeadunk egy valós és egy képzetes számot? Ha az így kapott számot négyzetre emeljük, akkor

$$(a + bi)^2 = a^2 + 2abi + (bi)^2 = a^2 + 2abi - b^2.$$

Ennek a számnak a négyzete nem valós, vagyis nem is pozitív, és nem is negatív. Ez azt jelenti, hogy ez a szám nem valós, és nem is képzetes. Azokat a számokat, melyek egy valós és egy képzetes szám összegeként állnak elő, komplex számoknak nevezzük. A komplex számok nyilván tartalmazzák mind a valós mind a képzetes számok halmazát. Kérdés, hogy a komplex számokkal végzett műveletek nem vezetnek-e egy még bővebb számhalmazhoz. Gondoljuk végig, vajon hogyan érdemes műveleteket végezni a komplex számok halmazán. Legyen $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, ekkor

$$(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i;$$

$$(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + cb)i.$$

Ellentmondás?

Kérdés persze, hogy az új számhalmazban végzett műveletek nem vezetnek-e ellentmondásra. Nézzük meg például a következő átalakítást:

$$-1 = \sqrt{-1}\sqrt{-1} = \sqrt{(-1)(-1)} = \sqrt{1} = 1.$$

Azt kaptuk tehát, hogy $1 = -1$, ami nyilván nem igaz. De hol követtük el a hibát? A válasz, hogy valójában nem beszéltük meg, hogy egy komplex számból hogyan vonunk gyököt. Márpedig a fenti esetben az 1 egy speciális komplex szám. Viszont a -1 -ből mint speciális számból korábban minden gond nélkül gyököt tudtunk vonni. De azért már ott is felmerült a kérdés, vajon csak egy olyan szám lesz-e ebben az új számhalmazban, amelyet ha négyzetre emelünk, -1 -et kapunk? Azért, hogy ezeket a problémákat feloldjuk, érdemes az egész számhalmazt az eddigihez képest fordított logikával felépíteni.

Definíció

Legyen $\mathbb{C} = \{(a, b) : a, b \in \mathbb{R}\} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$. A halmazon az összeadás és a szorzás legyen a következőképpen definiálva:

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d);$$
$$a + bi + c + di = a + c + (b + d)i;$$

$$(a, b)(c, d) = (ac - bd, ad + cb);$$
$$(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + cb)i.$$

Következmény:

$$i^2 = (0 + i)(0 + i) = (0 \cdot 1 - 1) + (0 \cdot 1 + 0 \cdot 1)i = -1.$$

Az így bevezetett halmazról és műveletekről megmutatható, hogy ellentmondásmentes, sőt kiterjesztése a valós számoknak, és azt is, hogy a valós számoknál megszokott műveleti azonosságok (asszociativitás, disztributivitás, kommutativitás, inverz műveletek) itt is érvényesek.

Alapfogalmak

Geometriai
szemléltetésMűveletek és
polinomok

Végezzük el a következő műveleteket:

① $5 + 6i + 4 - 2i$;

② $(3 + 2i)(7 - i)$!

Megoldások:

• $5 + 6i + 4 - 2i = (5 + 4) + (6 - 2)i = 9 + 4i$;

• (közvetlenül végigszámolva)

$$(3 + 2i)(7 - i) = 3 \cdot 7 + (2i) \cdot 7 + 3 \cdot (-i) + (2i)(-i) = \\ 21 + 14i - 3i - 2i^2 = 21 + 14i - 3i + 2 = 23 + 11i$$

(képletbe behelyettesítve)

$$(3 + 2i)(7 - i) = (3 \cdot 7 - 2 \cdot (-1))(3 \cdot (-1) + 2 \cdot 7)i = 23 + 11i$$

Definíció

Legyen $z \in \mathbb{C}$, ekkor $\sqrt[n]{z}$ jelölje az összes olyan komplex számot, melyre teljesül, hogy az n -edik hatványa éppen z . Az $\sqrt[n]{1}$ alakban felírható számokat egységgyököknek nevezzük.

Például nézzük meg, mit jelenthet a $\sqrt[4]{1}$.

Az 1-re és a -1 -re nyilván továbbra is igaz, hogy $1^4 = (-1)^4 = 1$.

Mivel $i^2 = -1$, ezért $(i)^4 = 1$, és könnyen látszik az is, hogy $(-i)^4 = 1$. Később azt is látni fogjuk, hogy más megoldás nem lehet.


Vizsgáljuk meg most újra a korábban látott ellentmondást. Az átalakításokkal nincs semmi gond, egészen az utolsó lépésig:

$$-1 = \sqrt{-1}\sqrt{-1} = \sqrt{(-1)(-1)} = \sqrt{1}.$$

Ez a kifejezés viszont nem egyenlő eggyel, csak annyit tudunk, hogy egyenlő egy olyan kifejezéssel, amit ha négyzetre emelünk 1-et kapunk, ami igaz a -1 -re.

Komplex számok a síkon

A definíciókból láttuk, hogy a komplex számok definiálhatók mint olyan valós számpárok, amelyeken speciális módon definiálunk műveleteket. Ha az összeadást nézzük, a művelet lényegében megegyezik azzal, ahogy kétdimenziós vektorok összegét definiáltuk. Ez is mutatja, hogy érdemes kétdimenziós síkban szemléltetni a komplex számokat.




Definíció

Legyen $z \in \mathbb{C}$, $z = a + bi$ alakú. Ekkor z konjugáltja:

$$\bar{z} = a - bi$$

alakban áll elő.



Definíció

Legyen $z \in \mathbb{C}$, $z = a + bi$ alakú. Ekkor z abszolútértéke:

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

képlettel számolható ki.

Tétel

Legyen $z \in \mathbb{C}$ tetszőleges komplex szám. Ekkor

$$|z| = \sqrt{z\bar{z}}.$$

Határozd meg a $z = 2 + 3i$ konjugáltját és abszolútértékét!

Megoldás:

ha $z = 2 + 3i$, akkor $\bar{z} = 2 - 3i$. A definíció alapján:

$$|z| = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13}.$$

A tétel ellenőrzéséhez pedig csak azt kell megnézni, hogy

$$z\bar{z} = (2 + 3i)(2 - 3i) = 4 - 9i^2 = 4 + 9 = 13.$$

A komplex számok trigonometrikus alakja

A vektorok polárkoordinátás alakját felhasználva a komplex számokat könnyen új alakban írhatjuk fel:


$$z = r(\cos(\phi) + i \sin(\phi)),$$

ahol $r = |z|$. Legyen két trigonemtrikus formában adott komplex számunk

$$z_1 = r_1(\cos(\phi_1) + i \sin(\phi_1));$$

$$z_2 = r_2(\cos(\phi_2) + i \sin(\phi_2)).$$

Ekkor $z_1 = z_2$ pontosan akkor, ha $r_1 = r_2$ és $\phi_1 = \phi_2 + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.



A komplex számok trigonometrikus alakja (folyt.)

4. hét

Lovics

Legyen például

$$z = 5 - 3i.$$

Ekkor

$$r = |z| = \sqrt{5^2 + 3^2} = \sqrt{34}.$$

Tudjuk továbbá, hogy

$$\operatorname{tg}(\phi) = -\frac{3}{5} = -0,6,$$

amiből következik, hogy $\phi = 149^\circ$ vagy $\phi = 329^\circ$. Mivel z nyilván a harmadik síknegyedben van, ezért a két alternatíva közül a 329° a helyes. Vagyis azt kaptuk, hogy

$$5 - 3i = \sqrt{34}(\cos(329^\circ) + i \sin(329^\circ)).$$

Alapfogalmak

Geometriai
szemléltetés

Műveletek és
polinomok

Komplex számok összeadása

4. hét


Lovics

Alapfogalmak

Geometriai
szemléltetés

Műveletek és
polinomok

A komplex számok összeadása grafikusan ugyanúgy történik, mint ahogy azt a vektoroknál megszoktuk. Ebben a trigonometrikus alak nem sokat segít.



Tétel (Moivre-tétel)

Legyen $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, melyek előállnak a következő alakban:

$$z_1 = r_1(\cos(\phi_1) + i \sin(\phi_1));$$

$$z_2 = r_2(\cos(\phi_2) + i \sin(\phi_2)).$$

Ekkor

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 (\cos(\phi_1 + \phi_2) + i \sin(\phi_1 + \phi_2)).$$

(Csak érdekességként jegyezzük meg, hogy a fenti képletből számos trigonometrikus azonosság pl. addíciós képletek nagyon gyorsan levezethetők.)

Határozzuk meg a trigonometrikus függvény segítségével a $(3 + 2i)(7 - i)$ értékét.

Megoldás

Korábban láttuk, hogy a megoldás $23 + 11i$. Legyen $z_1 = 3 + 2i$ és $z_2 = 7 - i$.

Ekkor $|z_1| = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13}$, $|z_2| = \sqrt{7^2 + 1^2} = \sqrt{50}$.

Jelölje ϕ_1 a z_1 -hez tartozó, ϕ_2 a z_2 -höz tartozó szöveget.

Ekkor $\operatorname{tg}(\phi_1) = \frac{2}{3}$, amiből $\phi_1 = 33,69^\circ$, mert $0^\circ < \phi_1 < 90^\circ$.

Valamint $\operatorname{tg}(\phi_2) = -\frac{1}{7}$, amiből $\phi_2 = -8,13^\circ$, mert $-90^\circ < \phi_2 < 0^\circ$. Ezek alapján

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= \sqrt{13 \cdot 50} (\cos(33,69^\circ - 8,13^\circ) + i \sin(33,69^\circ - 8,13^\circ)) = \\ &= \sqrt{650} (\cos(22,56^\circ) + i \sin(22,56^\circ)) = 22,94 + 10,96i. \end{aligned}$$

Hatványozás és gyökkvonás

Legyen $z = r(\cos(\phi) + i \sin(\phi))$ tetszőleges komplex szám. Ekkor a Moivre-tétel következményeként könnyen láthatjuk, hogy

$$z^n = r^n(\cos(n\phi) + i \sin(n\phi)).$$

A trigonometrikus alak egyik legfőbb erénye, hogy a gyökkvonás is viszonylag egyszerűen számolható vele. Sőt, azt a kérdést is tisztázni tudjuk, hogy a komplex számok halmazán hány n -edik gyöke van egy számnak. Keressük azokat a $w \in \mathbb{C}$ számokat, amelyekre teljesül, hogy

$$w^n = z = r(\cos(\phi) + i \sin(\phi)) = r(\cos(\phi + k2\pi) + i \sin(\phi + k2\pi)).$$

Legyen $w = \rho(\cos(\psi) + i \sin(\psi))$ alakú.
Ekkor

$$\rho^n(\cos(n\psi) + i \sin(n\psi)) = r(\cos(\phi + k2\pi) + i \sin(\phi + k2\pi)).$$

Ezek alapján egyrészt $\rho^n = r$, vagyis $\sqrt[n]{r} = \rho$.

Hatványozás és gyökvonás (folyt.)

Másrészt

$$n\psi = \phi + k2\pi;$$
$$\psi = \frac{\phi}{n} + \frac{k2\pi}{n}.$$

Kérdés, hány különböző n -edik gyök van. A képletből leolvasható, hogy minden esetben pontosan n , ahol az argumentumok a következők lehetnek:

$$\frac{\phi}{n}; \frac{\phi + 2\pi}{n}; \frac{\phi + 4\pi}{n}; \dots; \frac{\phi + (n-1)2\pi}{n}.$$

Összegezve tehát azt kaptuk, hogy

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r} \left(\cos\left(\frac{\phi}{n} + \frac{k2\pi}{n}\right) + i \sin\left(\frac{\phi}{n} + \frac{k2\pi}{n}\right) \right),$$

ahol $k = 0, 1, \dots, n-1$.

Hatványozás és gyökvonás (folyt.)

Például keressük meg a $\sqrt[3]{i}$ -értékeit.

Az i trigonometrikus alakja:

$$i = 1 \left(\left(\sin \left(\frac{\pi}{2} \right) + i \cos \left(\frac{\pi}{2} \right) \right) \right).$$

Ezért

$$\sqrt[3]{i} = \cos \left(\frac{\frac{\pi}{2} + k2\pi}{3} \right) + i \left(\frac{\frac{\pi}{2} + k2\pi}{3} \right),$$

$k = 0, 1, 2.$

Vagyis a gyökök a következő alakban írhatók fel:

$$z_1 = \cos \left(\frac{\pi}{6} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{6} \right) = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$$

$$z_2 = \cos \left(\frac{5\pi}{6} \right) + i \sin \left(\frac{5\pi}{6} \right) = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$$

$$z_3 = \cos \left(\frac{3\pi}{2} \right) + i \sin \left(\frac{3\pi}{2} \right) = -i.$$

Tétel

Legyen $z = a + bi$ alakú, tetszőleges nem nulla komplex szám.

Ekkor

$$\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{z\bar{z}} = \frac{a - bi}{a^2 + b^2}.$$

Példa: $\frac{1}{i}$.

Az i konjugáltja $-i$, $i(-i) = 1$, ezért

$$\frac{1}{i} = \frac{-i}{1} = -i.$$

Ellenőrzés:

$$i(-i) = -(i^2) = -(-1) = 1.$$

Az algebra alaptétele

Egy másodfokú polinomnál egyszerű osztással elérhető, hogy $x^2 + bx + c$ alakú legyen. Ha ennek a polinomnak létezik gyöke, akkor az felírható a következő alakban:

$$(x - x_1)(x - x_2).$$

Abban a speciális esetben, amikor $x_1 = x_2$, azt mondjuk, hogy a polinomnak kétszeres gyöke van. Más szavakkal ezt úgy fejezhetjük ki, hogy egy másodfokú polinomnak multiplicitással számolva 2 vagy 0 db gyöke van.

A kérdés általánosan is feltehető.

Legyen adva egy 1 főegyütthatós, n -ed fokú polinom:

$$x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0.$$

A kérdés, hogy ez átalakítható-e a következő alakra:

$$(x - x_1)^{\alpha_1} (x - x_2)^{\alpha_2} \dots (x - x_k)^{\alpha_k},$$

Az algebra alaptétele (folyt.)

ahol $\alpha_1 + \alpha_2 \cdots + \alpha_k = n$. Ha átalakítható, akkor azt mondjuk, hogy egy polinomnak multiplicitással számolva éppen annyi gyöke van, ahányad fokú a polinom. Már a másodfokú függvény vizsgálatából is kiderül, hogy a valós számok halmazán csak annyi mondható, hogy minden polinomnak, multiplicitással számolva, legfeljebb annyi gyöke van, ahányad fokú a polinom.

Tétel (Az algebra alaptétele)

Legyen $p(z)$ egy komplex együthatós n -ed fokú polinom. Ennek a polinomnak a komplex számok halmazán, multiplicitással számolva, éppen n db gyöke van.